

İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi. (")
Şarj No: (Damga ile)
Ruhsat tarih ve no.su:

Kullanıldığı Bitki ve Zararlılar

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu
Hıyar (Sera)	Kırmızı Örümcek (<i>Tetranychus spp.</i>)	800 ml / 100 l su
Armut	Armut Psillidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	1,5 l /100 l su
Şeftali	Dut Kabuklu Biti (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	3 l / 100 l su

KULLANMA ŞEKLİ:

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç bir miktar su ile ayrı bir kaptan karıştırılarak depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. Hazırlanan ilaçlı mahlül mutlaka basınçlı pülverizatör ile tatbik edilmelidir.

UYGULAMA ZAMANI VE SAYISI:

Hıyar (sera) Kırmızı Örümceği: Yapılan sayımlarda yaprak başına 3-5 adet canlı kırmızı örümcek isabet ederse mücadeleye karar verilir. Tek uygulama yeterlidir.

Armut Psillidi: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp, 2. ve 3. dönem nimflerin görülmeye başladığında ilaçlama yapılır. İhtiyaç duyulduğunda yaz ilaçlamaları yapılabilir.

Şeftali Dut Kabuklu Biti: Yaz mücadelesi olarak ilaçlamalar yapılır. İlk larva çıkışında birinci ve bu ilaçlamadan 20 gün sonra ikinci ilaçlama yapılır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Hektaş Sarritor® kükürt, captan ve folpet aktif maddeleri içeren ilaçlar ile karışmaz. Şayet söz konusu bitki koruma ürünleri bitkiye uygulanmış ise Hektaş Sarritor® uygulaması için 20 gün beklemek gerekmektedir. Hektaş Sarritor® tek başına kullanılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: Hektaş Sarritor® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre sınıflandırılmamış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Hektaş Sarritor®'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip insektisitlerle dönüşümlü olarak kullanılması tavsiye edilir.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. HEKTAŞ SARRİTOR®

İNSEKTİSİT/AKARİSİT
Emülsiyon konsantre (EC)
800 g/l Parafinik Mineral Yağ

Grup	-	Insektisit/Akarisit

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ

İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ

İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ

SİGARA İÇMEYİNİZ

DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ

İLAÇLANAMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI

KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Özel bir zehirlenme belirtisi yoktur.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Göz ile teması halinde: Göz kapaklarını açık tutarak bol su ile yıkayınız. Kızarıklık veya ağrı varsa doktora kontrol ettirilmelidir.

Deri ile teması halinde: Bol su ve sabun ile iyice yıkanmalıdır. Kirlenen elbiseyi çıkarıp temas eden cilt yıkanmalıdır. Ciltteki tahriş geçmezse doktora götürülmelidir.

Yutulması halinde: Bol miktarda yutulması durumunda zorla kusturulmadan doktora götürülmelidir.

Solunması halinde: Gaz solunması sonucu burun ve boğazda tahriş veya öksürük varsa etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Belirtiler devam ederse doktora götürülmelidir.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır.

® HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.'nin tescilli markasıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

07 Haziran 2016

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Net Miktarı (kg veya lt)
Azami perakende satış fiyatı: Baskı
T.B. Yazısının Tarih ve No.su:
Basılı şerit (imal tarihi ve şarj
no.su ile birlikte)

TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.

TEHLİKE SEMBOLLERİ:

Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.

İÇİNDEKİLER:

Parafinik Mineral Yağ

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RISK -
İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI: -

GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI: -

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR

- Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Hektaş Sarritor'un 5°C altında ve 32°C üstündeki sıcaklıklarda uygulanması tavsiye edilmez. Isı kontrolü gölgede yapılmalıdır.
- İlaçlama yapılacak bahçenin sulanmış olması tavsiye edilir.
- Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

DEPOLAMA DURUMU : Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI: Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

FİRMA ADI VE ADRESİ:

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇISI:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.


Gebze Organize Sanayi Bölgesi

İhsan Dede Cad.700. Sok.

41480 Gebze/KOCAELİ

Tel : (0262) 751 14 12

Fax : (0262) 751 14 22



REV.0