

TANCAN
DOMARK® 10 EC

Emülsiyon konsantre (EC)

GRUBU	G1, 3	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	-------	----------------------------

100 gr / L Tetraconazole

Önce etiketi okuyunuz
Evde kullanmayınız
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinde uzak tutunuz
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya bağda 15 gün, kabakgıl ve tütün tarlasına 7 gün, domates ve hıyar tarlasına 3 gün insan ve hayvan sokmayınız
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR
Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajlarının ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ
Genel zehirlenme belirtileri görülebilir

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse etiketi gösterin).
Solunum: Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Kazazede bayılmış ise eğitilmiş kişi tarafından suni solunum yapılabilir. Mümkünse oksijen verin. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.
Yutma: Kusturmayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kazazede bayılmış bölgesinden başka bir yere götürün. Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.
Ciltle Temas: Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi bol suyla iyice yıkayın. Yıkadıktan sonra tahrişin gelişmesi halinde doktora başvurun.
Gözlerle Temas: Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır

UZEM Ulusal Zehir Merkezi Tel: 114

® Isagro SpA'nın tescilli markası



Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:
İÇİNDEKİLER
Tetraconazole
Çözücü nafta
ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE
ZARARLILIK İFADELERİ
H302 Yutulması halinde zararlıdır
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür
H315 Cilt tahrişine yol açar
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar
H336 Rehavate veya baş dönmesine yol açabilir
H411 Sulcul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki
ÖNLEM İFADELERİ
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P273 Çevreye verilmesinden kaçının
P280 Koryucu eldiven/koryucu kıyafet/göz koryucu/yüz koryucu kullanın
P331 Kusturmayın
P391 Döküntüleri toplayın
P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun
KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
• Çiçeklenme zamanı kullanmayın
• Arılara zehirlidir
• Bahçelere zehirlidir. Sulara buluşturmayınız.
• Tavsiye edilen bitkilerde ve uygun dozda kullanıldığında fitotoksik etki görülmez.
• İlaç ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
• Boş kapları usulüne uygun olarak imha ediniz. Başka amaçlar için kullanmayınız.
• Ateş, kıvılcım ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
DEPOLAMA DURUMU
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.
FİRMA BEYANI
Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçı ürünün kalitesini garanti eder. İmalatçı ilacın hatalı depolanması, hatalı tatbiki ve tavsiyeler dışındaki kullanımından dolayı sorumlu değildir. Dört yıl süre ile spesifikasyonu uygunluğunu garanti eder.
ÜRETİCİ FİRMA: ISAGRO S.p.A. Caldera Business Park, Via Caldera 21, 20153 Milano – İTALYA
ÜRETİM TESİSİ: ISAGRO S.p.A. Via Nettunense km 23,400 04011 Aprilia (LT) İTALYA
RUHSAT SAHİBİ: TANCAN Dış Ticaret Limited Şirketi Karaman Çiftlik Yolu Eston Blokları Sahil Çarşı Bloğu K:14 Daire:51 İçerenköy İstanbul
Tel: +90-216-4690190

TANCAN Dış Ticaret Ltd. Şti.
Karaman Çiftliği Yolu Eston Blokları
Sahil Çarşı Bloğu Kat 14 Daire 51
İçerenköy 34752 Ataşehir İstanbul TURKEY
Tel: +90 216 469 01 90
E-posta: info@tancan.com.tr

Dr. Can Attila

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 4 Nisan 2002 – 4110

KULLANILACAGI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Bağ*	Külleme <i>Erysiphe necator</i>	30 ml/100 l su	14 gün
Çilek	Külleme <i>Sphaerotheca macularis f. sp. fragariae</i>	50 ml/100 l su	3 gün
Domates	Pathcangillerde külleme <i>Leveillula taurica</i>	50 ml/100 l su	3 gün
Fındık	Külleme <i>Erysiphe spp.</i>	50 ml/100 l su	21 gün
Hıyar	Kabakgillerde külleme <i>Erysiphe cichoracearum</i>	50 ml/100 l su	7 gün
Hıyar (Sera)	Külleme <i>Erysiphe cichoracearum</i>	50 ml/100 l su	3 gün
Şeftali	Külleme <i>Sphaerotheca pannosa var. persicae</i>	40 ml/100 l su	14 gün
Tütün	Külleme <i>Erysiphe cichoracearum</i>	40 ml/100 l su	7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakine ilaç su deposuna verilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanuncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılır.
Kalibrasyon: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.
Uygulama Makinesinin Temizliği: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sisteminin çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ Küllemesi:
1.uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde
2.uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomuruklarının olduğu dönemde
3.uygulama: Çiçek taç yapraklarının döktüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde.
4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır
Çilek Küllemesi:
1.uygulama: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır
2. ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları sonra erinceye kadar uygulamalara devam edilir
Pathcangillerde Külleme (Domates):
Uygulamalar ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır
Fındık Küllemesi:
Hastalık bahçede ilk defa çıkarsa, belirtiler görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. *P. guttata*'nın neden olduğu külleme hastalığı bahçede daha önceki yıllarda görülmüş ise belirtiler görülmeden önce yapraklar normal büyüklüğünü aldıktan sonra ilk ilaçlama yapılmalıdır. *Erysiphe sp.*'nin neden olduğu külleme hastalığı bahçede daha önceki yıllarda görülmüş ise meyve (çotanak) bağlama döneminde ilaçlamaya başlanır. Her iki hastalık etmeni için hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etki süresi dikkate alınarak ikinci ve diğer ilaçlamalara hasada kadar devam edilir. Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

03 Eylül 2018

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

Kabakgillerde Külleme (Hiyar):

İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulama devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C'nin üstünde ve oranlı neminde % 50'nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Şeftali Küllemesi:

1; **uygulama:** Önceki yıllardaki hastalığın yoğunluğuna göre belirlenmelidir. Hastalık bahçede ilk defa çıkıyorsa belirtiler görülür görülmez uygulamaya başlanmalıdır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise budamadan sonra yapılacak kontrollerde ağaçlardaki hastalıklı sürgün oranı %3'ü buluyorsa belirtiler görülmeden önce (yani önceki yıllarda hastalığın görüldüğü tarihten en az 5-8 gün önce veya sürgünler 20 cm olunca) ilk uygulama yapılmalıdır.

2; ve **diğer uygulamalar:** Bitkinin gelişmesine kullanılan preparatın etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar 14 gün arayla uygulamaya devam edilir

Tütün Küllemesi:

Uygulama yaprağın alt ve üst yüzünde ince bir film tabakası oluşturacak şekilde yapılmalıdır. İlk külleme lekeleri görülür görülmez uygulamalara başlanır. Tek uygulama yeterli olabilir. Epidemiy devam ederse 2. ve 3. uygulama 7-10 gün ara ile yenilenir

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

DOMARK 10 EC adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre grup G1, 3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **DOMARK 10 EC**'nin aynı sezon içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup G1, 3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİĞİ:

DOMARK 10 EC karışım halinde kullanılacaksa küçük hacimli bir ön karışım yapılmalıdır.

**TANCAN
DOMARK® 10 EC**

Emülsiyon konsantre (EC)

GRUBU	G1, 3	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	-------	----------------------------

100 gr / L Tetraconazole

Net Miktarı:

Azami Perakende Satış Fiyatı:

TANCAN Dış Ticaret Ltd. Şti.
Karaman Çiftliği Yolu Eston Blokları
Sahit Cami Bloğu Kat 14 Daire 51
İçerenköy 39757 Aşağıhisar İstanbul TURKEY
Tel: +90 216 469 01 90
Kozay 124 / 10 3910 010 714Z

Dr. Can Atilla

03 Eylül 2018

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

